



49 allées Charles de Fitte  
31300 Toulouse

05.61.77.47.17

thyroide@clinique-rivegauche.fr

Fax : 05.61.77.33.65



[www.clinique-rivegauche.fr](http://www.clinique-rivegauche.fr)

 **Clinique  
Rive Gauche**

# CENTRE TOULOUSE THYROÏDE



Toulouse  
Thyroïde

 **Clinique  
Rive Gauche**



## PRÉSENTATION DU CENTRE

Le centre Toulouse Thyroïde regroupe plusieurs spécialités autour de la prise en charge des pathologies thyroïdiennes.

**Responsable du centre :**  
Dr Sébastien FONTAINE

**Echographie, cytoponctions et microbiopsies :**  
Dr Sébastien FONTAINE

**Chirurgie vasculaire et thermo-ablation :**  
Dr Laurent CASBAS  
Dr Bertrand SAINT-LEBES

**Chirurgie ORL :**  
Dr Christelle TAVERGNIER

**Chirurgie pédiatrique :**  
Dr Philippe GALINIER

**Cytologie et anatomie pathologique :**  
Dr Laëtitia COLLIN (Laboratoire des Feuillants)

**Endocrinologie générale :**  
Dr Charlotte VAURS  
Dr Marie-Emilie CHAUCHEAU

## ÉCHOGRAPHIES CERVICALES

Réalisation pour vos patients de tous les examens échographiques cervicaux antérieurs : Thyroïde, Parathyroïdes et aires ganglionnaires.

Compte-rendu détaillé répondant aux critères qualité de la SFE et comprenant les grades EU-TIRADS et les recommandations de suivi ou de cytoponction complémentaire. Schémas de ROBBINS pour les suivis de ganglions cervicaux.

## MICROBIOPSIES

Réalisation des microbiopsies sous anesthésie locale et guidage échographique avec un trocart semi-automatique de 18G.

Indication sur les nodules > ou = 2cm et non contributifs en cytologie traditionnelle. Expertise anatomo-pathologique réalisée par le Dr COLLIN au Laboratoire des Feuillants et rendu du résultat dans un délai maximum de 2 semaines.

## CYTOPONCTIONS

Activité de Cytoponction sous guidage échographique de tout nodule ayant une indication d'expertise cytologique du fait de sa taille et de son grade EU-TIRADS.

Revue des caractéristiques et du grade EU-TIRADS si besoin avant le geste de Cytoponction.

Analyse cytologique systématiquement réalisée par le Dr COLLIN au Laboratoire des Feuillants et rendu du résultat dans un délai maximum de 2 semaines. La prise d'anticoagulant ou anti-agrégant doit être signalée lors de la prise du RDV.

## THERMO-ABLATIONS

Réalisation des procédures de thermo-ablation par RF sous anesthésie locale pour le traitement des nodules bénins (après cytoponction et/ou microbiopsie) responsable d'une gêne cervicale antérieure, esthétique ou compression loco-régionale.

Indication spécifique pour les nodules hyperfonctionnels avec TSH basse.

## ALCOOLISATIONS

Alcoolisation réalisée sur un kyste à liquide clair responsable d'une gêne cervicale antérieure, gêne esthétique ou à la déglutition. Evaluation dans un premier temps de l'indication puis ponction évacuatrice pour expertise cytologique et faisabilité de l'alcoolisation.

Réalisation de la procédure d'alcoolisation sous guidage échographique suivi d'un contrôle à 2 semaines puis 3 mois - 6 mois - 1 an.